Theorie und Modellierung am IAP

**Erich Becker
Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik (IAP)**

**Im Obergeschoss:
Wellen, Turbulenz, Strahlung und Chemie
Klima und Ozon**

Themen und Mitarbeiter der Abteilung Theorie und Modellierung

Schwerewellen und Turbulenz:

Ch. Zülicke, U. Schäfer-Rolffs, S. Brune, F. Senf, E. Becker

globale Zirkulation, Rossby-Wellen, thermische Gezeiten:

A. Gabriel, D. Peters, Ch. Zülicke, F. Senf, R. Knöpfel, E. Becker

Rossby-Wellen und Ozon:

D. Peters, A. Gabriel, Ch. Zülicke, P. Vagin (Gast)

Strahlung und Chemie gekoppelt mit **Dynamik**:

R. Knöpfel, M. Grygalashvyly, E. Becker

technische Mitarbeiterinnen:

H. Voß, B. Wecke und C. Schütt

Übergeordnete Thematik:

Prozessverständnis der Physik der gesamten Atmosphäre vom Boden bis über 100 km Höhe mit Schwerpunkt auf

Dynamik (= Strömungsmechanik der Atmosphäre)

Vertikaler Aufbau der Atmosphäre

- dynamische Kontrolle durch interne Schwerewellen
- dadurch weit weg vom „Strahlungsgleichgewicht“

- Wärmekraftmaschine
- Generierung von Wellen

„Strahlungsgleichgewicht“ im Januar

Klimasimulation für Januar

Vergleich mit „Strahlungsgleichgewicht“:

- sehr kalte Sommermesopause und inverser Temperaturverlauf zwischen ca. 70 und 95 km Höhe
- warme Winterstratosphäre; Winterstratopause
- völlig veränderte zonale Zirkulation überlagert mit einer Querkirkulation

Wie ?

„Strahlungsgleichgewicht“

Klima (Simulation)

Strahlungshaushalt der Atmosphäre

Eindimensionales Strahlungsgleichgewicht

Treibhauseffekt:

- Der Austausch von Wärmestrahlung zwischen Oberfläche und Atmosphäre bestimmt die Oberflächen- und Atmosphärentemperaturen, bei denen **Strahlungsgleichgewicht** herrscht.
- Eine höhere Treibhauskonzentration verschiebt das Gleichgewicht zu einer höheren Temperatur.
- Der Treibhauseffekt nimmt mit der Höhe ab und reicht maximal bis etwa 10 km.

Eindimensionales Strahlungsgleichgewicht

Temperatur (K)
MIT Absorption von solarer Strahlung in der Atmosphäre

mittlere Heizrate (K/d) durch Absorption solarer Strahlung in der Strato- und Mesosphäre

Jahresgang der täglich gemittelten solaren Einstrahlung am oberen Rand der Atmosphäre

Strahlungsbilanz am oberen Rand der Atmosphäre (Simulation)

Breitenabhängige Verteilung der Energiebilanz der Troposphäre im Januar (Simulation)

Wetterwirbel (**Rossby-Wellen**) in der Troposphäre:
Wärmeausgleich zwischen subtropischen und hohen Breiten und
Generierung der für die Mesosphäre wesentlichen **Schwerewellen**

Beispiel: 5 Modelltage (Bildintervall 45 Minuten) aus einer hochaufgelösten Simulation (Nordwinter)

*temperature (K) and
streamfunction in ~2 km*

240 250 260 270 280

*horiz. divergence (10^{-6} s^{-1}) and
streamfunction in ~10 km*

-60 -20 0 20 60

time (d) = 0

Wetterwirbel (**Rossby-Wellen**) in der Troposphäre:
Wärmeausgleich zwischen subtropischen und hohen Breiten und
Generierung der für die Mesosphäre wesentlichen **Schwerewellen**

Beispiel: 5 Modelltage (Bildintervall 45 Minuten) aus einer hochaufgelösten Simulation (Südsommer)

*temperature (K) and
streamfunction in ~2 km*

*horiz. divergence (10^{-6} s^{-1}) and
streamfunction in ~10 km*

time (d) = 0

Was sind Schwerewellen?

Schallwellen:

Longitudinal; dispersionsfrei;
Energie- und Phasenausbreitung in derselben Richtung
(weg von der Quelle);
Rückstellkraft: Kompressibilität

Was sind Schwerewellen?

Schallwellen:

longitudinal; dispersionsfrei;
Energie- und Phasenausbreitung in derselben Richtung
(weg von der Quelle);
Rückstellkraft: Kompressibilität

Schwerewellen:

transversal; dispersiv;
Energieausbreitung senkrecht zur Phasenausbreitung (zur Quelle hin);
Rückstellkraft: Auftrieb

Typische **mittlere** und momentane Temperatur- und Windprofile im Sommer (Simulation mit sehr hoher Auflösung)

Die meisten Schwerewellen „brechen“ bereits unterhalb von 50 km.

**„Schwerewellenbrechen“ im hochaufgelösten globalen Klimamodell:
Dynamische Instabilität triggert turbulente Diffusion.**

Warum brechen Schwerewellen, wenn sie sich vertikal ausbreiten?

Rossby-Wellen und Schwerewellen in der Sommerhemisphäre anhand der ostwärtigen und vertikalen Windkomponenten (hochaufgelöste Simulation, Januar, 54°S)

ostwärts
propagierende
Schwerwellen
in der
sommerlichen
Strato- und
Mesosphäre

Planetare Rossby-Wellen und Schwerewellen in der Winterhemisphäre anhand der ostwärtigen und vertikalen Windkomponenten (hochaufgelöste Simulation, Januar, 54°N)

meist
westwärts
propagierende
Schwerwellen
in der
winterlichen
Strato- und
Mesosphäre

Schwerwellen und planetare Rossby-Wellen im Bereich der Sommermesopause

Temperatur und Stromfunktion in ~86 km Höhe aus einer hochaufgelösten Simulation
(Bildintervall 45 Minuten): Diagnostik für unterschiedliche Skalen

all resolved scales > 150 km

only large scales > 1500 km

120

140

160

180

200

temperature (K)

time (d) = 0

simulierte Temperaturvariationen (K)
im Bereich der Sommermesospause (86 km, 60°S, Januar)

Warum sind Rossby-Wellen und Schwerwellen so wichtig?

- Diese Wellen transportieren Impuls und Energie von der Troposphäre in die oberen Schichten.
- Wenn die Wellen brechen, werden Impuls und Energie auf die globale Zirkulation übertragen.
- **Dadurch wird das globale Windsystem und die globale Temperaturverteilung in der gesamten Atmosphäre oberhalb von ca. 5 km Höhe dynamisch gesteuert.**

Sommer-Winterpol-Zirkulation bewirkt die extremen Abweichungen vom „Strahlungsgleichgewicht“ in der Mesosphäre

Wie ?

„Strahlungsgleichgewicht“

Klima (Simulation)

Rossby-Wellen und Schwerewellen

Zusammenfassung

- **Treibhauseffekt: *Strahlungsgleichgewicht* von Oberfläche und unterer Troposphäre verschiebt sich zu höheren Temperaturen, wenn man die Konzentration der Treibhausgase (Wasserdampf, CO₂, ...) erhöht.**
- **Rossby-Wellen in der Troposphäre: Wärmeausgleich zwischen subtrop. und polaren Breiten; Erzeugung von Schwerewellen, die die Mesosphäre dynamisch kontrollieren**
- **extreme Abweichungen vom “Strahlungsgleichgewicht” in der Strato- und Mesosphäre durch Rossby-Wellen und Schwerewellen**
- **Analog zur Troposphäre bilden sich “Wetterwirbel” auch in der kalten Sommermesopause. Ansonsten wäre es dort noch viel kälter.**